


D. L.  
- 2 JUIN 1954



Ministère de l'Agriculture  
SERVICE de la PROTECTION des VÉGÉTAUX

## BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION

### D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES


DU LANGUEDOC - ROUSSILLON  
MONTPELLIER - 16, rue de la République - Tél. M2 58.72

2ème année

N° 16

29 Mai 1954

## - RHYNCHITES -



Le RHYNCHITE BACCHUS est un coléoptère rouge violacé à reflets métalliques dont on constate la présence sur les abricotiers, les pruniers, les pommiers et parfois les pêchers. Les adultes mordent les feuilles, les fleurs et surtout les jeunes fruits, faisant sur les fruits des trous arrondis (schéma ci-contre). Non seulement les morsures abiment et déprécient les fruits, mais encore elles constituent des foyers d'infection par où pénètrent les germes de moniliose.

Le RHYNCHITE COUPE-POURGEON se rencontre surtout sur les pommiers et sur les poiriers dont il coupe les pousses. La femelle pond à l'extrémité des rameaux ensuite elle sectionne partiellement la tige au-dessous de la ponte. La pousse se dessèche et reste pendante.

LUTTE - Les pulvérisations de D.D.T., dès l'apparition des adultes, sont efficaces. Il faut 100 grs de matière active par hectolitre de bouillie.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,

P. BERVILLÉ

Le Contrôleur chargé  
des Avertissements Agricoles,

L. L. TROUILLON

-----  
Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon, 16 rue de la République, Montpellier. Le Gérant : R. BERTRAND. Autor. du 23/I/53. Reproduction, adaptation réservées

P 52



Ministère de l'Agriculture  
Ecole Nationale d'Agriculture de  
MONTPELLIER  
STATION REGIONALE  
D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Montpellier, le 29 Mai 1934.

MILDIOU.

COCHYLIS.

NOTE N° 7.

MILDIOU.

Dans les vignobles ayant subi les abondantes pluies du 13 au 18 mai, on constate la présence de repiquages autour des taches anciennes de mildiou.

Ces mêmes pluies ont également provoqué sur la végétation située près du sol, la formation de taches primaires consécutives à de nouvelles germinations d'oeufs d'hiver.

La maladie existe au moins depuis Banyuls (Pyrénées-Orientales) Marseillette (Aude), jusqu'au Rhône.

Dans ces conditions le relèvement de la température et l'activité de la croissance, amèneront au cours de la prochaine pluie, une grave extension du mildiou.

En conséquence, on ne peut que recommander le maintien d'une cadence rapide dans l'exécution des traitements et l'enlèvement des rejets du pied des souches, afin de mettre la végétation et la récolte à l'abri de surprises possibles.

COCHYLIS.

Dans la région de Pont-St-Esprit, les larves de première génération commencent à occasionner quelques dégâts sur les grappes, il y a donc lieu d'appliquer dès maintenant un traitement aux esters phosphoriques et de renouveler l'opération une dizaine de jours après.

Le Directeur de la Station Régionale  
d'Avvertissements Viticoles,

G. BERNON.